

Inofolic

Myo-inozitol + Folik Asit

Inofolic Yumuşak Jel Kapsül Kullanma Kılavuzu

Bileşimi:

Beher INOFOLIC yumuşak jel kapsülde 600 mg myo-inozitol ve 200 mcg folik asit bulunur.

Yumurtalıklar olgunlaşmış yumurta üretiminden sorumlu dişi üreme sistemi organıdır. Polikistik over sendromu (PKOS) ise yumurtalıkları tutan karmaşık bir bozukluktur. PKOS hastalarının yumurtalıklarında içi sıvı dolu kesecikler halinde kistlere ve dışarıdan bakıldığında dahi fark edilebilen anormal sayıda foliküle (yumurta kesesi) rastlanır. PKOS olgularında foliküller tam olarak olgunlaşmadığından ovülasyon (yumurtlama) nadiren olurken, adet düzensizliği ve infertilite (kısırlık) görülür. Aşırı kilo, erken saç dökülmesi ve aşırı tüylenme PKOS'nun diğer belirtileridir. Bilimsel çalışmalar PKOS'nun aşırı kilolu, obez veya ailesinde insülin direnci ve tip II diyabet geçmişi olan kadınlarda daha fazla görüldüğünü ortaya koymaktadır.

Bilimsel araştırmalar myo-inozitol desteğinin yumurtalık işlevlerini iyileştirdiğini saptamıştır. Myo-inozitolün diğer biyolojik rolleri arasında yağ ve şeker metabolizmasını ve merkezi sinir sistemindeki hücresel işlevleri düzenlemek ile saç uzamasını sağlamak da sayılmalıdır. Diyabet hastalarında myo-inozitolün sağlıklı bireylere kıyasla vücuttan daha fazla atıldığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Tip II diyabet hastalarında ve insülin direnci yüksek bireylerde myo-inozitol kullanımı genel klinik tabloyu iyileştirmek adına yarar sağlamaktadır. Myo-inozitol PKOS ile ilişkili metabolik değişimlerin ve üreme sistemi sorunlarının altında yatan mekanizmaları düzeltmeye veya önlemeye yardımcı olmaktadır.

Folik asit; aminoasit, protein ve nükleik asit sentezi ile kromozom onarımında çok önemli rolü olan, hücre çoğalmasında ve doku gelişiminde hayati öneme sahip bir bileşiktir. Folik asit homosistein adlı maddenin vücudumuzda aşırı miktarlara ulaşmasına ve böylece zararlı etkiler göstermesine engel olurken, nöral tüp defekti adı verilen bir grup doğum kusurunun önlenmesinde de etkin rol oynar.

INOFOLIC,

- Polikistik Over Sendromu (PKOS),
- yüksek insülin direnci,
- diyabet başlangıcı veya Tip II diyabet,
- kontrollü over hiperstimülasyonu durumlarında azalmış myo-inozitole bağlı gereksinimleri karşılamaya destek olur.

INOFOLIC kullananlarda nadiren mide bulantısı görülebilir. Bu belirti çoğu zaman kısa sürede ortadan kalkar.

Kullanım Şekli:

- INOFOLIC'i günün herhangi bir saatinde kullanabilirsiniz.
- Hekiminizin başkaca bir önerisi yoksa, günde 1-2 kapsül almanız önerilir.
- Hekiminiz ve/veya eczacınız tarafından önerilen dozda kullanınız.

INOFOLIC hekiminiz ve/veya eczacınız tarafından tek başına ya da başka bir tedaviye destek sağlamak amacıyla önerilebilir.

Saklama Koşulları:

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmesi önerilir. Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde muhafaza ediniz.

Ticari Takdim Şekli:

INOFOLIC 20 yumuşak jel kapsül içeren kutularda sunulmaktadır.

İthalatçı:

ITF İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Emniyetevleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Sapphire Residence No: 1/4 Kat: 31
D: 3101-3106 Kağıthane/İstanbul/Türkiye

Üretici / Alternatif Üretici:

Pharcoterm Srl. Via Abele Merli, 1, 20095 Cusano, Milanino (MI) İtalya
Nutrilinea Srl. Via Gran Bretagna, 1, 21013 Gallarate (VA) İtalya

İhracatçı:

LOLI Pharma Srl. Via dei Luxardo, 33 - 00156 Roma (RM) İtalya

Raf Ömrü:

Dış ambalajında yazılı olan tarihe kadar kullanılabilir.

Detaylı bilgi için:

www.inofolicvepkos.com
www.itfilac.com



ITF İLAÇ